

SUMMER MUSCAT



Oorsprong	USDA Agriculture Research Service vrystelling in 1999. Summer Muscat is spesifiek geteel en vrygestel met die oogmerk van vroeër rywording as Sultana Seedless om die aanvang van die oesseisoen te vervoeg, asook die moontlik toepassing van 'Droog-aan-die-Stok' verbouing. Hierdie kultivar is aangeplant in Kalifornië (VSA), maar beslaan nie naastenby die hektare van Selma Pete nie en is ook minder aangeplant as Diamond Muscat wat uit dieselfde teelprogram vrygestel is.			
Skaal aangeplant SA droog	Min aanplantings. Enigste kommersieel in Vanrhynsdorp			
Rusbreek	Middels			
Fisiologies	Bot	Buitegrond: 20-31 Augustus, Binnegron: 1-7 September		
	Blom	Buitegrond: 10-20 Oktober, Binnegron: 15-25 Oktober		
	Oes	Buitegrond: 1-10 Januarie, Binnegron: 7-15 Januarie		
Wingerkundig	Summer Muscat is 'n baie vrugbare, sterkgroeiende kultivar wat minstens 2-3 weke voor Sultana Seedless ryp word. Dit produseer baie trosse wat realiseer in goeie opbrengste. Ongelukkig set hierdie kultivar baie onegalig, wat aanleiding gee tot groot variasie in korrelgrootte binne dieselfde tros, asook tussen trosse. Die gevolg hiervan is dat daar groot variasie in suikervlakke van korrel tot korrel binne dieselfde tros, asook tussen trosse voorkom. Dit mag aanleiding gee tot swakker gradering weens die variasie in kwaliteit van rosyne. Dit maak dit ook moeilik om Goue Sultanas met goeie gradering te produseer - die vereiste van hierdie rosyntipe is 'n hoë, egalige suiker van die bronprodukt.			
Lowerbestuur	Na bot	Verwyder onodige lote uit die krone.		
	Voor blom	Tip aksie aan die begin van bot		
	Na set	Suier van blare kan voordelig wees tydens oes		
Groeiregulering	Stretch	Geen		
	Set	CPPU indien nodig		
	Vergroting	Geen		
Eienskappe	Soort	Droog		
	Rypwording	Vroeër as Sultana		
	Smaak	Ligte muskaat-karakter op vars druwe.		
	Tekstuur	Ovaalvormige korrels		
	Korrelgrootte	Medium		
	Vrugbaarheid	Uiters vrugbaar. Word hoofsaaklik as langdraers gesnoei met 8-10 lote per stok en 10-12 oë per loot. Gebruik van kortdraersnit weens vrugbaarheid is definitief 'n opsie.		
	Pitreste	None		
Swam siekte	Uiters gevoelig vir Witroes. Gevoelig vir Donskimmel. Swak bestand teen Botrytis weens korrels wat bars na reën.			
Verbouing	Snoeityd	Begin Julie		
	Snoei manier	Halflangdraers met n maksimum van 8 lote op n volwasse stok		
	Uitdun	Geen		
	Vergroting	Geen		
	Oeslading	± 38 ton/ha		
Oestyd	Tros grootte	Skouer, silindries		
	Reen bestandheid	Swak bestand. Korrels bars baie maklik na reën of hoë humiditeits toestande		
	Optimaal	Ths	Geskik	
Voordele	Golden	Nie geskik		
	OR	Nie geskik		
Nadele	Word 2-3 weke voor Sultanas ryp – verleng dus oesperiode en gebruik van drogingsfasiliteite			
	Vrugbaar met goeie gemiddelde oes jaar op jaar			
	Baie gevoelig vir reënskade			
Tipe produk	Groter risiko vir rypskade op koue liggings weens vroeë botdatum - liggingsseleksie is dus uiters belangrik			
	Groot variasie in grootte en suiker van korrels binne dieselde tros, asook tussen trosse wat aanwending vir sekere rosyntipes beperk			
	Geswawelde rosyne nie geskik			
Voëlskade weens vroeë rywording				
	Sondroog	X	WP	X
				

Vrywaring:

Nie Raisins SA of die skrywer kan aanspreeklik of verantwoordelik gehou word vir enige verlies voorspruitend uit die besluite of aksies gebasser op inligting in hierdie riglyne. Terwyl enige voordeel daaruit slegs tot voordeel van die gebruiker is.